

Avinew™ NeO



Vacuna viva para la prevención de la Enfermedad de Newcastle en las aves en forma de tableta efervescente.



FORMULA

Cada dosis contiene:

Virus activo de la Enfermedad de Newcastle, cepa VG/GA.

Originada en cultivo celular de embrión de pollo Libre de Patógenos Específicos (SPF).



INDICACIONES

Tipo de Ave:

La vacuna está recomendada para uso en todo tipo de aves pollos de engorda, pollitas reproductoras y ponedoras.



VÍA DE ADMINISTRACIÓN

La vacuna puede ser administrada por métodos de vacunación masivos o individuales.



MÉTODOS MASIVOS

Aspersión:

- Disolver el comprimido en agua (3 a 5 mL). Diluir a continuación en el volumen de agua correspondiente al número de aves a vacunar.

- Utilice un equipo que sea especialmente diseñado para vacunar por aspersión.

- Utilice agua desmineralizada.

- Siga las instrucciones de uso del equipo proporcionadas por Boehringer Ingelheim.



Agua de bebida:

- Elimine la administración de medicamentos o desinfectantes en el agua de bebida por lo menos 72 horas antes de la vacunación.



MÉTODO INDIVIDUAL

Gota ocular:

Se requiere de un diluyente de agua tri-distilada en volumen suficiente a razón de 0.03 ml por ave (*no incluido con la vacuna*).



ALMACENAMIENTO:

Mantener en refrigeración entre 2 a 7 °C.



PRESENTACIÓN

Caja con tabletas efervescentes con 10 x 2,000 dosis.

INFORMACIÓN EXCLUSIVA PARA USO DEL MÉDICO VETERINARIO

Elaborado en Francia por: Boehringer Ingelheim.
Importado y distribuido por: Boehringer Ingelheim Animal Health México, S.A. de C.V.