

3FLEX®

En una sola aplicación ofrece triple protección contra algunas de las principales enfermedades respiratorias del cerdo como PRRS, M. hyo y PCV2.

Número de Registro B-6407-151



DESCRIPCIÓN:

Vacuna intramuscular

Única vacuna aprobada por la USDA contra el síndrome reproductivo y respiratorio porcino, circovirus porcino tipo 2 y *Mycoplasma hyopneumoniae*.



COMPOSICIÓN

Ingelvac CircoFLEX® 1. Circovirus porcino tipo 2 inactivado en vector de baculovirus.
Ingelvac MycoFLEX® 2. Cultivos químicamente inactivados de *Mycoplasma hyopneumoniae*.
Ingelvac® PRRS 3. Virus vivo modificado cepa ATCC-VR-2332 del síndrome reproductivo y respiratorio porcino (PRRS) con ImpranFLEX como adyuvante patentado a base de polímero acuoso.



INDICACIONES

Para la vacunación de cerdos sanos susceptibles de 3 semanas en adelante como ayuda en la reducción de la viremia y la prevención de la depleción linfóide e inflamación y colonización del tejido linfóide asociado a circovirus porcino tipo 2, así también en la reducción de la neumonía enzoótica causada por *Mycoplasma hyopneumoniae* y como ayuda en la reducción de la enfermedad respiratoria.



PREPARACIÓN:

- Mezclar de manera aséptica las vacunas líquidas de acuerdo al diagrama de instrucciones.
- Rehidratar la vacuna liofilizada PRRS MLV transfiriendo en forma aséptica el contenido total de los productos líquidos mezclados, de acuerdo al diagrama.
- Agitar bien y utilizar inmediatamente. Utilizar el contenido completo del frasco una vez abierto.
- Rehidratar únicamente con las vacunas que la acompañan.
- No mezclar con otras sustancias.

PRESENTACIÓN:

Paquete con Ingelvac CircoFLEX® 1, Ingelvac MycoFLEX 2 y un frasco de Ingelvac PRRS® MLV 3





DOSIS:

Usar técnica aséptica, inyectar una sola dosis de 2 ml por vía intramuscular (IM).



ADVERTENCIAS:

- Solo vacune animales sanos.
- Almacenar entre 2-7°C. No congelar. Utilizar el contenido completo del frasco una vez abierto.
- No vacunar dentro de los 21 días anteriores al sacrificio de los animales.
- El virus vacunal de PRRS puede ser excretado y transmitido a otras poblaciones de porcinos que estén en contacto con los cerdos vacunados.
- La duración de la transmisión potencial del virus de PRRS puede variar.
- Todo medicamento no utilizado o los derivados del mismo deberán eliminarse de conformidad con la normatividad local aplicable.
- En caso de reacción anafiláctica, la epinefrina es el tratamiento sintomático.
- Evitar el alcance de los niños y animales.



PRESENTACIONES:

El paquete contiene un frasco de Ingelvac CircoFLEX® 1 de 50 dosis (50 ml), un frasco de Ingelvac MycoFLEX® 2 de 50 dosis (50 ml) y un frasco de Ingelvac PRRS® MLV 3 de 50 dosis (30 ml).

Ingelvac MycoFLEX® se presenta en un frasco headspace (HSB) con capacidad adicional con la intención de ser mezclada de manera aseptica con los otros dos productos.

Para uso Veterinario

DIAGRAMA DE MEZCLADO:

