



ENTERISOL® ILEITIS

Es la primera y única vacuna viva oral contra *L. intracellullaris* que genera amplia y duradera protección, mejorando así el desempeño productivo del cerdo.

Número de Registro B-6407-155

DESCRIPCIÓN:

Vacuna oral

Vacuna una dosis, efectiva, segura y conveniente contra *Lawsonia intracellullaris* (Ileitis), cepa B3903.



COMPOSICIÓN:

Contiene cultivo vivo avirulento, liofilizado de *Lawsonia intracellullaris*, cepa B3903.



INDICACIONES:

Recomendada para la vacunación de cerdos sanos susceptibles de 3 semanas de edad o mayores, como ayuda en la prevención y control de la enteropatía proliferativa porcina (Ileitis) clínica y subclínica causada por *Lawsonia intracellullaris*.



DOSIS:

Administrar una sola dosis de 2 ml por vía oral a partir de la 3ra semana de edad.

Utilizar la cánula dispuesta por el laboratorio.



PREPARACIÓN:

Rehidratar la forma liofilizada de la vacuna con el contenido completo del diluyente estéril que trae. Agite bien y use inmediatamente todo el contenido.



PRESENTACIÓN:

100 ml (50 dosis).
Para uso Veterinario.





ADVERTENCIAS:

- Vacune solo animales sanos.
- Manténgase entre 2 y 7°C, protegido de la luz solar directa.
- Evite su congelación.
- Agite el frasco antes de usar.
- Utilice todo el contenido una vez abierto el frasco.
- No vacunar 21 días antes del sacrificio de los animales destinados al consumo humano.
- Cerdos que han recibido niveles terapéuticos de antibióticos vía inyección, alimentación o agua de bebida no deberán ser vacunados hasta que el efecto del antibiótico y la eliminación de este del organismo haya cesado.
- Todo medicamento no utilizado o los derivados del mismo deberán eliminarse de conformidad con la normatividad local aplicable.
- No usar en hembras gestantes ni sementales.
- No use el producto junto con antibióticos.
- Retire el uso de antibióticos en el agua y/o en el alimento tres días antes, durante y tres días después de la vacunación.
- Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.
- En caso de reacciones anafilácticas utilice epinefrina como antídoto.




DIAGRAMA DE MEZCLADO:

- 1) **Iniciar:** Con todo lo necesario para la aplicación de Enterisol® Ileitis.
- 2) **Rehidratar:** Reconstruya la vacuna lo más rápido posible con todo el diluyente del frasco contenido en el empaque.
- 3) **Preparar:** Para administración oral, dosis única de 2ml en cerdos a partir de la primera semana de edad.
- 4) **Aplicar:** Toma oral directa, de fácil aplicación.

