



INGELVAC PRRS[®] MLV

Confiere protección cruzada y probada contra la más amplia variedad de virus de PRRS tipo 2.



Número de Registro B-6407-152.

DESCRIPCIÓN:

Vacuna Intramuscular

Vacuna líder de virus vivo modificado para proteger la industria porcina contra el síndrome reproductivo y respiratorio porcino (PRRSv)



COMPOSICIÓN

Cada dosis contiene como mínimo: Virus vivo modificado cepa ATCC-VR-2332, del síndrome reproductivo y respiratorio porcino (PRRS) 10DICT50 propagado en cultivos celulares.



INDICACIONES

- Recomendada para la vacunación de lechones, reemplazos y reproductoras en cualquier etapa de producción en rebaños positivos a PRRS.
- Provee protección cruzada contra desafíos heterólogos y demostrando la reducción significativa de fallas reproductivas y de enfermedad respiratoria causada por el virus de PRRS.
- Rehidrate la vacuna añadiendo una fracción del diluyente estéril al contenido del frasco de la porción liofilizada.
- Mezcle bien y trasfiera la suspensión reconstituida devuelta a la botella del diluyente estéril, para mezclar con el remanente del diluyente y completar el volumen total de 100 ml.
- Agite bien y use inmediatamente.

PRESENTACIÓN:

30 ml liofilizado + 100 ml diluyente estéril (50 dosis).
Para uso veterinario





DOSIS:

Contra la forma reproductiva vacune:

Hembras de reemplazo: 2 dosis de 2 ml cada una, con diferencia de 2 semanas entre cada aplicación.

Reproductoras: 1 dosis de 2 ml entre 3 y 4 veces al año

Contra la forma respiratoria vacune:

Lechones: 1 dosis de 2 ml a partir de las 2 semanas de edad.

Vía intramuscular



ADVERTENCIAS:

- Vacune sólo animales sanos.
- No vacunar sementales.
- Manténgase entre 2 y 7°C, protegido de la luz solar directa.
- Evite su congelación.
- Agite el frasco antes de usar.
- Utilice todo el contenido una vez abierto el frasco.
- Todo medicamento no utilizado o los derivados del mismo deberán eliminarse de conformidad con la normatividad local aplicable.
- Manténgase fuera del alcance y de la vista de los niños y animales domésticos.
- En caso de reacciones anafilácticas, utilice epinefrina como antídoto.

DIAGRAMA DE MEZCLADO:

